


ОЧАКВАНА СРЕДНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРЕДСТОЯЩИЯ ЖИВОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ ВАРНА ПРЕЗ ПЕРИОДА 2019 - 2021 ГОДИНА

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот¹ на населението в област Варна, изчислена за периода 2019 - 2021 г., е 74.2 години, като спрямо предходния период (2018 - 2020 г.) тя намалява с 1.2 години. Средната продължителност на живота в областта е с 0.6 години по-висока от средната за страната - 73.6 години.

Област Варна, заедно с областите Кърджали (75.5), София (столица) (74.9) и Благоевград (74.3), е сред областите с най-висока средна продължителност на живота на населението в страната, а с най-ниска са областите Видин (70.5) и Монтана (70.6 години).

Фиг. 1. Очакваната средна продължителност на предстоящия живот по области



¹ Показателят за очакваната продължителност на живота показва средната продължителност на предстоящия живот на новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през дадена година повъзrastова смъртност.

Подробна информация за очакваната средна продължителност на предстоящия живот за отделните възрасти е публикувана на сайта на НСИ в рубриката „Население и демографски процеси“, тема „Таблицы за смъртност“.

Различната смъртност при мъжете и жените определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

1. Очакваната средна продължителност на предстоящия живот в област Варна по пол

Периоди	Общо	Мъже	Жени
2009 - 2011	74.4	71.2	77.7
2010 - 2012	74.8	71.6	77.9
2011 - 2013	75.2	71.9	78.5
2012 - 2014	75.3	72.0	78.7
2013 - 2015	75.4	71.9	78.9
2014 - 2016	75.3	71.8	78.8
2015 - 2017	75.4	72.1	78.9
2016 - 2018	75.5	72.2	78.9
2017 - 2019	75.8	72.5	79.1
2018 - 2020	75.4	72.0	78.8
2019 - 2021	74.2	70.8	77.7

Средната продължителност на живота при мъжете в област Варна е 70.8 години, докато при жените е с 6.9 години по-висока - 77.7 години. И при двата пола равнището на показателя за периода остава по-високо от регистрираното средно за страната.

Спрямо 2011 през 2021 г. средната продължителност на живота в област Варна намалява с 0.2 години. При мъжете наблюдаваме намаление на средната продължителност с 0.4 години, докато при жените тя остава непроменена. Най-голяма е разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот между двата пола в периодите 2013 - 2015 г. и 2014 - 2016 г. - 7.0 години, а най-малка в периода 2010 - 2012 г. - 6.3 години в полза на жените.



Методологични бележки

Таблиците за смъртност (биометрични таблици) се използват за изучаване на повъзрастовата смъртност на населението. Те показват порядъка на измирането на едно поколение и отразяват постепенното намаление на състава му под влияние на смъртността. Таблиците съдържат система от повъзрастови коефициенти (представени като функция на възрастта), които измерват нивото на смъртността в отделните периоди от времето, доживяването до определена възраст, продължителността на живота и други.

Таблиците за смъртност се изчисляват въз основа на данни за броя на умрелите лица по единична възраст и година на раждане; брой на населението по единична възраст и броя на живородените **от три последователни години**.

Показателят „средна продължителност на предстоящия живот“, изчисляван въз основа на данните от таблиците за смъртност, измерва очакваното (вероятностно) количество години (или брой години), които предстои средно да преживее едно лице на възраст x (лицата от всяка възраст), при условие че през целия му живот интензивността на смъртността ще се запази същата, каквато е била през текущия период.

Средната продължителност на предстоящия живот се изчислява като отношение на сумата на човекогодините, които предстоят да преживеят достигналите дадена възраст x за целия период от предстоящия им живот (от възраст x до пределната възраст), към броя на доживелите възрастта x .

Средната продължителност на предстоящия живот на новороденото се приема за средна продължителност на живота на населението.